

MASTI VEYXYM®

intramamarna suspenzija

lijek za lokalnu primjenu, proteolitički enzimi, vitamini A i E za krave u laktaciji

Sastav

Jedan injektor Masti Veyxym® u 10 g suspenzije sadržava:

α -tokoferol acetat (vit. E)	120 mg
Retinol palmitat (vit. A)	58.82 mg
Kimotripsin	8 mg
Tripsin	8 mg
Papain	4 mg

Pomoćne tvari: glicerol monostearat 40:50, trigliceridi srednje dužine lanca i hidrofobni bazični gel.

Osnovna svojstva i djelovanje

Proteolitički enzimi kimotripsin, tripsin i papain razgrađuju eksudat i pseudomembrane u upaljenom vimenu, lokalno pospješuju mijenu tvari i umanjuju znakove upale u mliječnoj žlijezdi.

Vit. A povećava permeabilnost tkiva, potiče diobu stanica te pospješuje epitelizaciju. U velikoj koncentraciji nalazi se, zajedno s vit. E, u lipidnom matriksu vanjskog dijela staničnih membrana. Pri tome vit. E djeluje antioksidacijski te štiti celularne i subcelularne strukture od peroksida koji se oslobađaju u tijeku upale.

Indikacije

- **Neinfekcijski poremećaji sekrecije mlijeka (kataralne upale);**
- **Stenoze mliječnih prohoda i stvaranje ožiljnog tkiva;**
- **Pomoć u liječenju akutnih, kroničnih ili supkliničkih mastitisa u kombinaciji s antibioticima, a u skladu s antibiogramom.**

Kontraindikacije

Nisu poznate.

Način primjene i doze

Nakon što se vime u cijelosti izmuze, opere i dezinficira vršak sise, sadržaj jednog injektora aplicira se u svaku četvrt. Ovisno o težini upale pripravak se aplicira 1-3 x s razmakom od 12 sati.

U slučaju teškog mastitisa istodobno se smiju upotrebljavati odgovarajući antimikrobni lijekovi.

- Graviditet i laktacija

Suspenzija Masti Veyxym® može se upotrebljavati u tijeku graviditeta i laktacije.

Karencija

Meso i jestive iznutrice:

0 dana.

Mlijeko:

4 dana.

Način čuvanja

Na suhom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25°C) te izvan pogleda i dosega djece.

Oprema

Kartonska kutija u kojoj je 10 polietilenskih injektora sa po 10 g i.mam. uljne suspenzije.