

Pana Veyxal® mast

- Razgrađuje upalne i nekrotične produkte
- Potiče lokalni imunosti sustav
- Potiče granulaciju
- Spriječava stvaranje prekomjernog ožiljkastog tkiva

Pana Veyxal® mast sadrži visoko učinkovitu kombinaciju proteolitičkih enzima i vitamina. Ovaj pripravak može se koristiti za enzimatsko čišćenje rana kao i za ubrzavanje procesa cijeljenja rana, pogotovo kod ozljeda koje se nalaze na teško dostupnim mjestima.

Proteolitički enzimi razgrađuju upalne produkte i ostatke tkiva koji sadrže ili se sastoje od proteina, a zdravo je tkivo zaštićeno od proteolitičkog djelovanja zahvaljujući anti-enzimima i alfa2-makroglobulinu.

Ova mast potiče fibrinolizu, stvaranje granulacijskog tkiva i ubrzava proces cijeljenja rana. Spriječava stvaranje prekomjernog ožiljkastog tkiva. In vitro i in vivo istraživanja dokazala su da proteolitički enzimi uništavaju mikroorganizme i znatno umanjuju njihove faktore virulencije.

Pana Veyxal® mast, u kombinaciji sa antibiotskom terapijom, potiče brzo cijeljenje opekotina, a pomaže i kod truležnih i gnojnih procesa. Vitamini A i E ubrzavaju cijeljenje.

Pana Veyxal® mast

Mast za primjenu kod konja, goveda, koza, ovaca, svinja, pasa i mačaka.

Sastav i djelatna tvar:

10 g masti sadrži:

Kimotripsin (510.00 FIP-U)
Tripsin (258.00 FIP-U)
Papain (27.75 FIP-U)
Retinol palmitat (42.500 IU)
α-tokoferil acetat (25.00 mg)

Ciljne vrste:

Konji, goveda, svinje, ovce, koze, psi i mačke.

Indikacije za upotrebu:

Enzimatsko čišćenje rana i ubrzavanje procesa cijeljenja rana.

Kontraindikacije i nuspojave:

Nije primjenjivo.

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o veterinarsko-medicinskom proizvodu, molimo obavijestite svog veterinara.

Doziranje i način primjene:

Za primjenu na koži.

Aplicirati jednom ili više puta dnevno izravno na ranu. Mast koristiti svakodnevno dok rana ne zacijeli.

Napomene:

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Skladištiti na temperaturi od 2-8 °C.

Zaštiti od topline.

Sadržaj načete bočice iskoristiti u roku od 28 dana.

Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti naznačenog na pakiranju.

Posebna upozorenja:**Upotreba tijekom graviditeta i laktacije:**

Mast je sigurna za upotrebu tijekom graviditeta i laktacije.

Interakcije sa drugim medicinskim proizvodima:

Pojačava učinak antibiotske terapije, posebno kod inficiranih, gnojnih i nekrotičnih rana.

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrebljenog proizvoda ili otpadnih materijala:

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.

Oprema:

Kantica od 150 g.

Tuba od 20 g.

Prije upotrebe pročitati upute o lijeku!