

**San
Ditan®**

Panazym-Zinc Spray

Aktivna zaštita za kožu sa
proteolitičkim enzimima,
cinkom i vitaminima



Animal care



SAVJETI ZA PRAVILNU PRIMJENU

Dobro protresti prije primjene. SanDitan® Panazym-Zinc Spray treba primijeniti na čistu i suhu kožu sa udaljenosti od oko 15 cm. Ukoliko je potrebno, može se primijeniti i više puta dnevno.

Preparat ne sadržava inhibitore niti nadražuje, pa se stoga, može koristiti više puta dnevno.

ZAPAMTITE

Samo za vanjsku primjenu.
Izbjegavati dodir s očima.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Spremnik je pod tlakom. Zaštititi od direktnog sunčevog svjetla i ne izlagati temperaturama višim od 50°C. Ne otvarati na silu, probijati ili paliti, čak i kad ste potrošili sadržaj spremnika. Ne sprejati na otvoreni plamen ili na bilo kakav usijani materijal.

Držati dalje od izvora vatre. Ne pušiti. Čuvati izvan pogleda i dosega djece. Za vrijeme primjene treba osigurati provjetravanje prostora kako bi se izbjegla mogućnost stvaranja eksplozivne smjese. Za pravilno odlaganje spremnik treba isprazniti u potpunosti.

VELIČINA PAKOVANJA

Sprej boca od 150 mL

Veyx-Pharma is GMP- and QS-certified.

Veyx-Pharma GmbH · Soehreweg 6 · 34639 Schwarzenborn · Germany
Phone 0049 5686 99860 · Fax 0049 5686 1489 · E-Mail zentrale@veyx.de
www.veyx.de

05/2014