



SENSIBLEX®

lijekovi koji se koriste u porodništvu
tokospazmolitik, denaverin
za goveda i pse

Sastav

Jedan mL Sensiblex® injekcijske otopine sadržava:

Denaverin hidroklorid	40 mg
Pomoćne tvari: benzilni alkohol	20 mg.

Djelovanje

U veterinarskoj medicini denaverin se koristi za reguliranje kontrakcija miometrija tijekom poroda. Sensiblex® opušta glatku muskulaturu te djeluje relaksirajuće na maternicu pripremljenu za porod i istodobno povećava rastezljivost mekog dijela porođajnog kanala. Nakon s.c. i i.m. aplikacije Sensiblex®-a, kravama učinak denaverina nastupi nakon 15 - 30 min. Miorelaksirajuće djelovanje traje do nekoliko sati, a analgetički učinak iznosi najviše 90 min. Sensiblex® se u pravilu aplicira jednokratno, a po potrebi aplikacija se može ponoviti nakon približno 60 min.

Osim tokospazmolitičkog učinka denaverin djeluje anestetički na površinu porođajnog kanala, iskazuje antikonvulzijsko djelovanje i istodobno blagi trankvilizacijski i antipiretički učinak. Denaverin pospješuje djelovanje oksitocina, a sa morfinom iskazuje aditivni efekt. Optimalnim pojačavanjem trudova i istodobnim povećavanjem rastezljivosti grlića maternice, rodnice i stidnice olakšava se porod i umanjuje opasnost za ženku i plod. Denaverin se preporučuje primijeniti u slučajevima patološkog poroda i u okolnostima komplikacija tijekom otvaranja, širenja i kontrakcija - pri čemu nema mehaničkih prepreka (npr. preveliki plod, nepravilan položaj i dr.). Sensiblex® je neznatno toksičan i životinje ga dobro podnose.

Indikacije

Govedo

- Olakšavanje poroda junica;
- Aktiviranje prekinutog poroda;
- Nedostatno otvaranje i dilatiranje porođajnog kanala zbog slabih trudova, nepravilnog položaja ploda i njegovih malformacija i dr.;
- Suženje cerviksa 1. i 2. stupnja nakon ispravljanja torzije maternice; Reguliranje kontrakcija maternice u okolnostima slabih trudova ili prejakog tonusa miometrija kada je uterus pripremljen za porod. Za olakšavanje poroda Sensiblex® treba aplicirati pri završetku faze otvaranja ili tijekom širenja (noge i glava u prednjem položaju).
- Olakšavanje izvođenja fetotomije i umanjivanje opasnosti od povreda (preveliki plod, malformacija ploda, nepravilni položaji živog ili uginulog ploda). Prilikom fetotomije potrebno je uz denaverin dati epiduralnu anesteziju. Ako je nužno, injekcija Sensiblex®-a smije se ponoviti nakon 40-60 min. u istoj dozi.

Pas i mačka

- Zakašnjeli ili prekinuti porod koji se može otkloniti primjenom tokospazmolitika i oksitocina.

Kontraindikacije

Denaverin ne djeluje u pripreмноj fazi poroda i u ranoj fazi otvaranja. U to vrijeme grlić maternice je još zatvoren ili nedostаточно otvoren te Sensiblex® ne treba primjenjivati.

Način primjene i doze

Sensiblex® se daje i.m. ili s.c. Učinak nastupi 5 - 10 min. po aplikaciji, a u cijelosti je izražen nakon sljedećih 10 min.

Životinja	Sensiblex® - i.m., s.c.
Junica	5 – 10 mL
Krava	10 mL

Kuja	0.5 – 1 mL (ev. sa 3 - 10 i.j. oksitocina)

Nuspojave

Na mjestu injiciranja (i.m. ili s.c.) ponekad nastane upalna otekline koja se tijekom kraćeg vremena povuče.

Ako se primijete neželjeni učinci ovog pripravka treba obavijestiti Centar za nuspojave veterinarskih lijekova pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Zastupnika u Hrvatskoj.

Napomene, mjere opreza, interakcije i dr.***Sigurnost za životinje***

Prije aplikacije Sensiblex®-a nužno je da veterinar - stručnjak iz porodništva pregleda životinju i odredi u kojoj je fazi porod te kakav je položaj i veličina ploda.

Sensiblex® se smije aplicirati samo ako je cerviks dovoljno otvoren i ako je nastupila faza dilatacije porođajnog kanala.

Ukoliko je potrebno, tretirane životinje smije se podvrgnuti carskom rezu.

- Predoziranje

Nema podataka.

- Interakcije

Sensiblex® se u štrcaljki ne smije miješati s drugim injekcijskim pripravcima. *In vivo* interakcije s drugim lijekovima nisu opisane.

- Graviditet i laktacija

Pripravak se ne koristi tijekom graviditeta i laktacije.

Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek

Nema opasnosti za osobe koje primjenjuju lijek.

Sigurnost za okoliš

Pripravak ne predstavlja opasnost za okoliš.

Karencija

Meso, organi i druga jestiva tkiva: 0 dana.

Mlijeko: 0 dana.

Način čuvanja

Na tamnom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25°C) i izvan dosega djece.

Postupak s neiskorištenim lijekom i praznom ambalažom

S neiskorištenim lijekom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu (NN br. 178/04).

Rok valjanosti

Označen je na opremi, u originalnoj ambalaži 2 godine. Sadržaj načete bočice preporučuje se utrošiti u roku od 28 dana.

Način izdavanja

Na veterinarski recept.

Oprema

Bočica od stakla s brombutilnim čepom i aluminijskom kapicom sa 50 mL injekcijske otopine, kutija sa 1 ili 6 bočica a 10 mL, kutija sa 1 ili 6 bočica a 20 mL