

**Sunlitan Enzym Zink sprej**  
**Kozmetički sprej za njegu i zaštitu oštećene kože**

**SASTAV:**

1g spreja sadrži:

0,204g Retinol palmitate (vit A), 0,089g Papain, 0,041g Trypsin, 0,008g Chymotrypsin, 0,012g Tocopheryl acetat(vit E), 5,76g Zink oksid.

**FARMACEUTSKA GRUPA:**

Chymotrypsin i Trypsin pripadaju grupi proteolitičkih enzima sadržanih u probavnom sustavu ljudi i životinja. Papain je proteolitički enzim biljnog porijekla(Carica Papaja).

ACTvet kod: QDO3B

Vitamin A i E pripadaju grupi teškotopivih vitamina.

ACTvet kod: QA11JA kombinacija vitamina

**MEHANIZAM DJELOVANJA:**

Tri enzima Chymotrypsin, Trypsin, Papain tvore visoko molekularni polimer različitih aminokiselina. Ovi enzimi kontroliraju katalitičke intra i ekstra stanične metaboličke procese, i time, ovisno o profilu djelovanja, stvaraju razlike u njihovoj djelotvornosti kao esterase ili polipeptaze. Stupanj aktivnosti je multivarijantan. Oni djeluju ne samo lokalno nego i sistemski. Njihova uspješnost može biti otkrivena, na primjer u slučaju stečenog manjka enzima ( poremećaj krvne koagulacije, uvjetovani enzimski poremećaj unutarnjih probavnih procesa i ostalo). Tako Pana Zink sprej stvara prije svega proteolitičke uvjete koji pospješuju metabolizam te efekte koji sprječavaju upalu.

Vit E ima ulogu prevencije oksidacije višestruko nezasićenih masnih kiselina, reagira sa slobodnim radikalima koji uzrokuju oksidativna oštećenja staničnih membrana, bez stvaranja drugog slobodnog radikala u procesu.

**INDIKACIJE:**

Koristi se za intenzivnu zaštitu kože protiv vanjskih utjecaja(voda, urin, ekstremni uvjeti, kod korištenja zavoja). Dobar je za brzo obnavljanje, ne izaziva pretjeranu granulaciju, te jača lokalni imunitet.

**KONTRAINDIKACIJE:**

Nisu poznate

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

Nanijeti na suhu i čistu kožu, sa udaljenosti otprilike 15 cm od rane. Ako je potrebno ponoviti više puta.

**MJERE OPREZA PRI RUKOVANJU:**

Čuvati od sunca i temperature preko 50 c, kanta je pod pritiskom, ne uništavati nakon upotrebe. Ne sprejati u vatru niti na jako vruće materijale. Držati dalje od izvora plamena, ne pušiti u blizini. Osigurati dovoljno ventilacije kako bi se zaštitili od lakozapaljivih isparenja i plinova.

**PROIZVOĐAČ:**

VEYX Pharma GmbH