

VeyFo®A V P - RecoTon

- Sadrži važne nutrijente i mikronutrijente poput: aminokiselina, vitamina B kompleksa (visoko koncentrirani B12 + L-karnitin), fosfora.
- Sudjeluje u metabolizmu masti (lipoliza i lipogeneza)
- Za rad jetre

Sastav:

Natrij klorid, natrij fosfat, glukoza i fiziološki važni dodaci (na 1,000 ml):

70,000 mg L-karnitina,
30,000 mg nikotinamida,
5,000 mg L-lizina,
5,000 mg DL-metionina,
5,000 mg glicina,
3600 mg dekspantenola,
1,000 mg DL-valina,
800 mg L-leucina,
600 mg DL-fenilalanina,
500 mg L-arginina,
400 mg DL-isoleucina,
400 mg L-treonina,
200 mg L-histidina,
200 mg DL-triptofana,
50,000 µg vitamina B12,
2,000 mg vitamina B6,
800 mg vitamina B2,
fosforna kiselina (E 338),
Kalij sorbat (E 202)
Veyx premiks „ Butafan-B-tain 100/37 sensoric“.

VeyFo® AVP-RecoTon ima izvrsnu biodostupnost organski vezanih komponenti.

Proizvod se životinjama daje putem hrane ili vode za piće.

Koristi se kao dodatak prehrani za umanjivanje stresa kod svinja, posebice kod rasplodnih krmača tijekom poroda, puerperija, laktacije i odbijanja prašćića. Tijekom stresnih razdoblja posebno je opterećena jetra, a povećani su i zahtjevi organizma za metabolizmom masti i minerala. Kao posljedica stresa javlja se prestanak ili nedovoljna laktacija, nezadovoljavajuća kvaliteta mlijeka što se odražava i na leglo; dolazi do problema s plodnošću i drugih važnih problema. Kod prašćića dolazi do povećanog mortaliteta i lošeg prirasta.

Kod drugih životinjskih vrsta proizvod se ne koristi kao dodatak prehrani već kao dodatak s ciljem ispunjavanja nutritivno-fizioloških potreba organizma tijekom kraćih vremenskih perioda.

Doziranje i način primjene:

Svinje:

- Umanjivanje stresa koji se može javiti tijekom poroda, puerperija, krajem laktacije ili tijekom transporta/promjene smještaja
- Doza: Primjenjivati tijekom 1-7 dana

Rasplodne krmače: 30 ml u bolusu ili 5 ml/dan

Prašćići: 3 ml u bolusu; 0.2-1.0 ml putem vode za piće; 0.5-1.5 ml/L/dan putem hrane.

Svinje: do 15 ml u bolusu ili do 2 ml/dan.

Prije upotrebe savjetovati se s odgovornim veterinarom.

Psi, mačke i mali glodavci:

Kod ovih vrsta proizvod se ne koristi kao dodatak prehrani već kao dodatak s ciljem ispunjavanja nutritivno-fizioloških potreba organizma tijekom kraćih vremenskih perioda.

Psi: 0.5 -5.0 ml

Mačke i mali glodavci: 0.5- 2-5 ml

Golubovi pismošne i ukrasne ptice

VeyFo® AVP-RecoTon se kod ptica koristi s cilje zadovoljavanja kratkotrajnih povećanih potreba organizma, posebice prije, za vrijeme i nakon natjecanja. Ukoliko se ne odgovori na potrebe organizma dolazi do poremećaja rada jetre i bolesti jetre. Proizvod je preporučljivo koristiti i tijekom sezone parenja, leženja i mitarenja.

Golubovi pismošne:

1ml/L/dan vode za piće na 20 golubova, dva puta tjedno. Na dan primjene životinjama bi trebala biti ponuđena samo vodena otopina VeyFo® AVP-RecoTon-a.

Ukrasne ptice:

0.5-1.0 ml/kg t.m.

Kod kahektičnih životinja i kod životinja gdje postoji hipofunkcija jetre primjenjuje se VeyFo® AVP-RecoTon razrijeđen sa Ringerovom otopinom ili infuzijskom otopinom u omjeru 1:3.

Oprema:

Bočica 100 i 250 ml.

Napomene:

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Skladištiti na temperaturi do 20 °C i zaštititi od svjetla.

Proizvod ima rok trajanja 24 mjeseca od dana proizvodnje.

Sadržaj načete bočice iskoristiti u roku od 6 mjeseci.

Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti.

Prije upotrebe pročitati uputu o proizvodu!