

VeyFo®

Antilax Immuno

- Poboljšava lokalnu imunost probavnog trakta

Antilax Bacto Ferm

- Štiti od patogenih bakterija

Antilax OligoLyt

- Oligosaharidni energetski pojačivač za rehidraciju organizma

VeyFo® Antilax Immuno

Sastav:

Mlijeko u prahu (kolostrum porijeklom od krava slobodnih od IBR-a) sa ciljem poboljšanja lokalne imunosti probavnog sustava. Sadrži protutijela, izvrstan izvor energije sa hranjivom vrijednošću, aminkiselinama, elektrolitima i puferkim tvarima.

Uravnotežuje vodu i elektrolite u organizmu i potiče uspostavu normalnih probavnih procesa. Kod pasa i mačaka koristi se za ublažavanje akutnih malapsorpcijskih poremećaja.

Doziranje i način primjene:

100 g VeyFo® Antilax Immuno otopiti u mlakoj vodi. Količina po životinji ovisi o težini životinje, starosti i stupnju dehidracije.

Koristiti 1 do 7 dana kod rizika od razvoja probavnih poremećaja, tijekom i nakon probavnih poremećaja.

Telad:

Dnevna doza 2-3 litre pripravka otopljenog u vodi. Teletu treba redovito nuditi mlijeko ili mliječnu zamjenu. Dnevnu dozu rasporediti u 3 dnevna obroka.

Ždrebac, prasad, janjad i jarad:

Standardna prehrana (mlijeko) mora biti stalno na raspolaganju. VeyFo® Antilax Immuno-pripravak ponuditi barem 3 puta tijekom dana. Kod životinja koje samostalno unose potrebne količine vode u organizam oporavak je brži nego kod životinja kojima je potrebna infuzijska terapija.

Pripravak davati tijekom 1-2 tjedna kod pojave akutnih probavnih poremećaja.

Psi i mačke:

Standardna prehrana (mlijeko) mora biti stalno na raspolaganju. VeyFo® Antilax Immuno-pripravak daje se ovisno o dobi i visini životinje u količini od 1 do ml, više puta tijekom dana.

Mlijeko u prahu dobiveno je od krava koje su u krvi imale visok titar specifičnih protutijela protiv najčešćih uzročnika poput E.coli i nekih virusa (Rotavirus, korona virus) te će se ta protutijela prenijeti i na mladunčad koja konzumira njihovo mlijeko. Miješavina mlijeka iz više mužnji garantira široki standardizirani spektar imunoglobulina (protutijela).

U mladim životinjama kod kojih se ovaj proizvod primjenjuje razvija se lokalna imunost zahvaljujući vezanju protutijela na sluznicu crijeva. I druge bioaktivne tvari sadržane u proizvodu, poput laktoperoksidaze i lizozima, imaju izražen učinak u borbi protiv patogena koji izazivaju probavne poremećaje.

Dokazano je da zaštitne tvari iz kolostrumu krava, a koje se nalaze u VeyFo® Antilax Immuno, štite ne samo telad već i mladunčad drugih životinjskih vrsta.

Oprema:

6 x 100 g vrećice, 100 x 100 g vrećice

VeyFo® Antilax Bacto Ferm

Sastav:

Zaštita od patogenih bakterija. Prašak od mlijeka fermentiranog Laktobacilima. Energetski i nutritivni dodatak prehrani sa elektrolitima/puferskim tvarima, aminokiselinama, vitaminom E i željezom.

Koristi se za uspostavljanje ravnoteže između metabolizma vode i elektrolita te održavanje normalnih probavnih procesa.

Doziranje i način primjene:

100 g VeyFo® Antilax Immuno otopiti u mlakoj vodi. Količina po životinji ovisi o težini životinje, starosti i stupnju dehidracije.

Telad:

Dnevna doza 2-3 litre pripravka otopljenog u vodi. Teletu treba redovito nuditi mlijeko ili mliječnu zamjenu. Dnevnu dozu rasporediti u 3 dnevna obroka.

Ždrebac, prasac, janjad i jarad:

Standardna prehrana (mlijeko) mora biti stalno na raspolaganju. VeyFo® Antilax Immuno-pripravak ponuditi barem 3 puta tijekom dana. Kod životinja koje samostalno unose potrebne količine vode u organizam oporavak je brži nego kod životinja kojima je potrebna infuzijska terapija.

VeyFo® Antilax Bacto Ferm može se davati i kao profilaksa u slučajevima kada se očekuje povišena razina stresa (npr. promjena smještaja ili dugotrajni transport).

Preciznim miješanjem dobiven je proizvod sa uravnoteženim izvorima energije i nutritivnih tvari, elektrolita, aminokiselina, vitamina, minerala, aroma (vanilin, kamilica, komorač) i Bactoferm 10H11 LB- fermentiranim mlijeko u prahu koji osiguravaju brzo i precizno djelovanje u aktiviranju crijevnih fizioloških zaštitnih mehanizama.

Bacto Ferm je dobiven fermentacijom sirovog mlijeka sa dodatkom starter kulture laktobacilusa. Proizvod je u emulziji koja sadrži visoku koncentraciju laktobacila koji u crijevu prekrivaju sluznicu i štite ju do vezanja patogenih bakterija.

Oprema:

100 g vrećica, 5 kg kanta

VeyFo® Antilax OligoLyt

Sastav:

Oligosaharidi (maltodekstrin, maltoza/maltotioza), natrij bikarbonat, glicin, dekstroza, natrij klorid, kalij klorid.

Koristi se za uspostavljanje ravnoteže između metabolizma vode i elektrolita te održavanje normalnih probavnih procesa.

VeyFo® Antilax OligoLyt je novi pripravak za rehidraciju organizma za primjenu kod teladi i mladunčadi drugih životinjskih vrsta.

U VeyFo® Antilax OligoLyt-u nalazi se mješavina maltodextrina, maltoze, maltotioze, tj. oligosaharida koji su izvrstan izvor energije.

Otopina koja se dobiva korištenjem ovog proizvoda je blago hipotonična zbog prisutstva oligosaharida (290mmol/L), ali ima veliku energetska vrijednost za organizam. Određene vrste oligosaharida podliježu razgradnji te se apsorbiraju u obliku glukoze. Zahvaljujući tome njihova je osmotska aktivnost manja te smanjuju rizik nastanka osmotskog proljeva koji nastaje zbog glukoze. Normalna konzistencija fecesa uspostavlja se već 1-2 dana nakon početka primjene.

Brzo djelovanje omogućuje vraćanje standardnoj prehrani (mlijeku) i smanjuje rizik od nastanka nutritivnih deficita.

Dodatak bikarbonata djeluje protiv metabolične acidoze i omogućava brz oporavak.

Sljedeći nutritivni ciljevi su postignuti primjenom ovog proizvoda:

- * Kompenzacija prethodno izgubljene tekućine i elektrolita, kao i gubitka tekućine koja se javlja tijekom bolesti

- * Vraćanje acidobazne ravnoteže i osiguravanje lako probavljivih izvora energije.

Prije korištenja posavjetovati se sa odgovornim veterinarom.

Doziranje i način primjene:

Gubitak tekućine, veliki gubitak elektrolita i energije u slučaju probavnih poremećaja, druge indikacije za upotrebu proizvoda.

Prašak za pripremu otopine za rehidraciju i oporavak:

40 g VeyFo® Antilax OligoLyt (1 puna žlica) otopiti u 1 litri mlake vode (40°C). Neprekidno miješati dok se prašak u potpunosti otopi u vodi.

Telad:

1. dan: Dati pripravak umjesto mlijeka/mlječne zamjenice 2-3 puta/dan ili 1-2 litre ponuditi između obroka.

2. i 3. dan: 2-3 puta/dan ponuditi ½ dnevnog unosa otopine i ½ dnevnog unosa mlijeka/mlječne zamjenice. Manje količine ponuditi većoj ili slaboj teladi više puta tijekom dana između standardnih obroka.

Ždrebac, prasac, janjad i jarad:

Dati u količini od 40g/L dva puta dnevno tijekom 2 dana, uz mliječni obrok.

Ponuditi minimalno 3 puta dnevno između isanjanja.

Kod životinja koje samostalno unose potrebne količine vode u organizam oporavak je brži nego kod životinja kojima je potrebna infuzijska terapija.

VeyFo® Antilax OligoLyt može se davati i kao profilaksa u slučajevima kada se očekuje povišena razina stresa (npr. promjena smještaja ili dugotrajni transport).

Oprema:

1 kg kantica

Dozator:

1 puna žlica = 40 g