

VeyFo®Energa Mol
VeyFo®Osimol
VeyFo®Veyxapron

- Provjerena kombinacija sastojaka koja djeluje na metabolizam i regulira pH vrijednost
- Brzo dostupan izvor energije
- Stimulacija i održavanje ruminalne peristaltike

Sastav:

VeyFo® Energa Mol, Veyxapron i Osimol su dodaci prehrani namijenjeni smanjivanju rizika od nastanka ketoze/acetonemije kod mlijecnih krava i ovaca.

VeyFo® Energa Mol:

Suspenzija koja sadrži propilen glikol (20%), kalcij klorid (12%) i natrij klorid.

1 litra pripravka sadrži i:

160,000 mg natrij propionata,
100,000 mg kalcij formijata,
40,000 mg kolin klorida,
20,000 mg DL-metionina,
10,000 mg nikotinamida
Voda (kao nosač).

Osnovni analitički sastojci su: 25% sirovog pepela, 5% kalcija, 3% natrija.

VeyFo® Energa Mol se, zahvaljujući svojim sastojcima koji se brzo apsorbiraju u organizmu, pokazao uspješnim u praksi za regulaciju pH vrijednosti i kao brzi izvor energije za organizam. Uravnotežen unos kalcija koji se lako i brzo apsorbira osigurava ravnotežu u organizmu, posebice nakon poroda.

VeyFo® Veyxapron

Za stimulaciju i održavanje ruminalne peristaltike.

1 kg praška sadrži:

399 g natrij propionata, kao i sušeni kvasac i krupicu od pšeničnih mekinja.

Primjena ovog pripravka može spriječiti ili umanjiti indigestiju izazvanu poremećajima rada buraga. Kvasac ima važnu ulogu u stimulaciji i održavanju ruminalne peristaltike.

VeyFo® Osimol

1 kg praška sadrži:

500 g kalcij propionata

345 g natrij propionata

1.70 g mangana

0.325 g bakra,

Natrij bikarbonat i dekstroza.

Osnovni analitički sastojci su: kalcij 10%, natrij 10%

VeyFo® Osimol ima visoki udjel kalcija i natrij propionata te osigurava adekvatnu opskrbu organizma propionskom kiselinom. Nakon apsorpcije, propionska kiselina ima važnu ulogu u formiranju glukoze kao izvora energije. Sastojci u ovom pripravku potiču aktivnost mikroorganizama u buragu i imaju pozitivan učinak na rad predželudaca jer stimuliraju različite metaboličke procese.

Doziranje i način primjene:

VeyFo® Energa Mol je suspenzija i može se primijeniti peroralno.

VeyFo® Veyxapron i Osimol daje se putem hrane i vode ili razrijeđen u vodi aplicira se uz pomoć odgovarajuće opreme („drencher“).

U mliječnih krava primijeniti neposredno nakon telenja ili tijekom prvih 2-6 tjedana laktacije. U ovaca se primjenjuje 6 tjedana prije poroda i prva 3 tjedna nakon poroda, a preporučene doze su sljedeće:

VeyFo® Energa Mol

Mliječne krave: 1 boca (500 ml).

Prema potrebi može se dati odmah nakon teljenja, i ponoviti nakon 12 i 24 sata.

Ovce: 100 ml

Prema potrebi može se dati odmah nakon janjenja, i ponoviti nakon 12 i 24 sata.

Oprema: 500 ml boca

VeyFo® Veyxapron (za poticanje ruminalne peristaltike)

Mliječne krave: 1 vrećica (100 grama) dva puta dnevno

Ovce: ½ vrećice (50 g) dva puta dnevno

Kada je ugroženo zdravlje životinje ovaj proizvod se preporuča davati kontinuirano tijekom prvog tjedna laktacije.

Proizvod se može davati i kao potporna terapija u liječenju ketoze, ali isključivo prema uputama odgovornog veterinara.

Oprema:

Vrećca 100 g; 6x100 g vrećice; 100x100 g vrećice; vreća od 5 kg.

VeyFo® Osimol

Mliječne krave: 100 g/dan, započeti na dan teljenja.

Kod ketoze i probavnih smetnji davati 100g u intervalima od 12 sati.

Ovce: 20g/dan, započeti na dan janjenja.

Kod ketoze i probavnih smetnji davati 20g u intervalima od 12 sati.

Oprema:

Vrećica 100g; vrećice 100x100 g

It is advisable to additionally provide VeyFo® Veyxapron using the recommended dosage rates, in order to stimulate the rumen's natural rhythmical activity.

Package sizes:

100 g sachet, 100 x 100 g sachets

Prije upotrebe proizvoda preporučljivo se posavjetovati sa veterinarom.

Ovi proizvodi mogu biti potporna terapija veterinarskom liječenju ketoze/acetonemije, a koriste se i kod oporavka od ketoze.

Primjenom Veyxaprона potiče se nutritivan oporavak buraga i ponovna ruminacija.
Korištenje ovih proizvoda može biti iznimno važno za uspješnost terapije.

Napomene:

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Skladištiti na temperaturi do 20 °C.

Proizvod ima rok trajanja 24 mjeseca od dana proizvodnje.

Sadržaj načete boćice iskoristiti u roku od 6 mjeseci.

Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti.

Prije upotrebe pročitati uputu o proizvodu!