

Veyxyl® Tabs



■ Infekcije endometrija

■ Retencija placente





Aktivna tvar Veyxyl® Tabs, je polu-sintetski amoksicilin, antibiotik iz skupine penicilina sa baktericidnim učinkom. Primjeren je za oralnu upotrebu.

Amoksicilin ometa razvoj stanične stijenke tijekom faze proliferacije kroz kompetitivu inhibiciju transpeptidaza i smanjuje unakrižno povezivanje linearnih lanaca koji se sastoje od aminošećera i aminokiselina. Rezultat toga je poremećaj osmotske ravnoteže nastao zbog neispravne kohezije mukopeptidnog kompleksa. Nakon perioda latencije dolazi do lize mikroorganizama. Amoksicilin ima minimalni bakteriostatski učinak na bakterije koje nisu u fazi proliferacije.

Amoksicilin djeluje baktericidno na gram-pozitivne i gram-negativne patogene, a ima širi antibakterijski spektar u usporedbi sa benzilpenicilinom (Penicilin G). Pojava rezistentnih sojeva dokazana je in vitro, i, kao kod svih penicilina, događa se polako i u fazama. Može doći do križne rezistencije sa drugim penicilinima.

Amoksicilin ima minimalnu toksičnost i siguran je za primjenu.

Veyxyl® Tabs,
800 mg/tableti,
Tablete za primjenu kod goveda, svinja, konja, ovaca i pasa.

Kvalitativni i kvantitativni sastav

1 tableta sadrži:

Djelatna tvar:

800.00 mg Amoksicilina (918.4 mg Amoksicilin trihidrata)

Indikacije

Za liječenje sljedećih bolesti izazvanih gram-pozitivnim i/ili gram-negativnim uzročnicima osjetljivima na amoksicilin.

Psi; oralna primjena:

Infekcije pluća i dišnog sustava, probavnog sustava, urogenitalne infekcije, lokalizirane infekcije, sekundarne bakterijske infekcije nastale nakon virusnih infekcija.

Goveda, svinje, ovce i koze; intrauterina primjena:

Infekcije endometrija, zaostajanje posteljice.

Prije početka terapije sa Veyxyl® Tabs preporučljivo je odrediti osjetljivost uzročnika na amoksicilin, posebno u slučaju infekcija probavnog sustava, budući da *E.coli* i *Salmonellae* vrlo brzo razvijaju otpornost na amoksicilin.

Kontraindikacije

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na peniciline ili cefalosporine; kod teških oštećenja bubrega koje prati anurija i oligurija; kod prisutnosti patogena koji tvore β -laktamaze;

Ne primjenjivati oralnim putem kod preživača, konja, kunića, zamoraca, hrčaka i drugih malih glodavaca.

Ne primjenjivati Veyxyl® Tabs kod životinja koje teže manje od 40 kg.

Nuspojave:

Alergijske reakcije (alergijske kožne reakcije, anafilaktični šok).
Ukoliko se pojavi alergijska reakcija na Veyxyl® Tabs, terapiju treba odmah prekinuti.

Protumjere:

U slučaju anafilaktičkog šoka primijeniti adrenaline (epinefrin) i glukokortikoidie u venu. Kod kožnih alergijskih reakcija primijeniti antihistaminike i/ili glukokortikoide.

Nakon oralne primjene mogu se povremeno pojaviti poremećaji rada probavnog sustava (povraćanje, proljev, anoreksija).

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o veterinarsko-medicinskom proizvodu, molimo obavijestite svog veterinara.

Ciljne vrste životinja:

Goveda, svinje, konji, ovca, pas.

Doziranje, način i putevi primjene:

Za oralnu primjenu:

Psi iznad 40 kilograma tjelesne mase:

10 mg amoksicilina po kilogramu, oralna primjena dva puta dnevno tijekom 3-5 uzastopnih dana (10 mg amoksicilina po kilogramu jednako je 1/2 Veyxyl® Tabs tablete na 40 kg tjelesne mase). Tablete je moguće primijeniti i putem hrane.

Ukoliko nakon 3 dana provođenja terapije nema vidnog poboljšanja tada je potrebno preispitati dijagnozu i promijeniti terapiju. Preporučljivo je napraviti antibiogram.

S terapijom treba nastaviti 2 dana nakon nestanka kliničkih simptoma.

Za intrauterinu primjenu:

Doza po tretmanu:

Konji: 800 mg amoksicilina, jednako je 1 tableti Veyxyl® Tabs

Goveda: 400 – 800 mg amoksicilina, jednako je ½ – 1 tableti Veyxyl® Tabs

Ovce, svinje: 400 mg amoksicilina, jednako je ½ tablete Veyxyl® Tabs

Provede se dva tretmana u intervalu od dva dana. Preporučljivo je napraviti antibiogram prije početka terapije.

Savijeti za ispravnu primjenu

Nije primjenjivo.

Karencija:

Goveda, ovce i konji:	Meso i jestive iznutrice: 4 dana
	Mlijeko: 2 dana
Svinje:	Meso i jestive iznutrice: 4 dana

Posebne mjere pri čuvanju

Držati izvan pogleda i dohvata djece.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti označenog na kutiji.

Čuvati na suhom mjestu. Čuvati pri temperaturi do +25 °C.

Posebne mjere opreza

Posebne mjere opreza prilikom primjene kod ciljnih vrsta:

Nije primjenjivo.

Posebne mjere opreza prilikom primjene kod životinja:

Nije primjenjivo.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:

Osobe preosjetljive na penicilin trebaju izbjegavati direktan kontakt veterinarsko-medicinskog proizvoda sa kožom i sluznicama.

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja:

Nije primjenjivo.

Interakcije sa drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcije: Postoji potencijalni antagonizam sa penicilinima i kemoterapeuticima.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno:

U slučaju predoziranja javljaju se simptomi ekscitacije CNS-a, a mogu se pojaviti spazmi/konvulzije. Terapiju Veyxyl® Tabs tabletama treba prekinuti i odmah poduzeti simptomatsko liječenje administracijom benzodiazepina ili barbiturata (antidoti).

Inkompatibilnosti: Nije primjenjivo.

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrebljenog veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu u zaštiti okoliša.

Veličina pakovanja

Klizni okvir sa 10 tableta

Dodatno pakovanje sa 100 tableta

Molimo pročitati uputu o lijeku prije korištenja veterinarsko-medicinskog proizvoda.

Veyx-Pharma is GMP- and QS-certified.

Veyx-Pharma GmbH · Soehreweg 6 · 34639 Schwarzenborn · Germany

CVA d.o.o. · Tel. +385-(091)4655112 · Fax +385-(01) 6604031 ·
E-Mail cva@cva.hr Web: www.veyx.hr

03/2014