

Veyxyl Tabs

***Infekcije endometrija**

*** Retencija placente**

Aktivna tvar Veyxyl Tabs je polu-sintetski amoksisicilin, antibiotik iz skupine penicilina sa baktericidnim učinkom. Primjeren je za oralnu upotrebu.

Amoksisicilin ometa razvoj stanične stijenke tijekom faze proliferacije kroz kompetitivu inhibiciju transpeptidaza i smanjuje unakrižno povezivanje linearnih lanaca koji se sastoje od aminošećera i aminokiselina. Rezultat toga je poremećaj osmotske ravnoteže nastao zbog neispravne kohezije mukopeptidnog kompleksa. Nakon perioda latencije dolazi do lize mikroorganizama. Amoksisicilin ima minimalni bakteriostatski učinak na bakterije koje nisu u fazi proliferacije.

Amoksisicilin djeluje baktericidno na gram-pozitivne i gram-negativne patogene, a ima širi antibakterijski spektar u usporedbi sa benzilpenicilinom (Penicilin G). Pojava rezistentnih sojeva dokazana je in vitro, i, kao kod svih penicilina, događa se polako i u fazama. Može doći do križne rezistencije sa drugim penicilinima.

Amoksisicilin ima minimalnu toksičnost i siguran je za primjenu.

Veyxyl® Tabs,
800 mg/tableti,
Tablete za primjenu kod goveda, svinja, konja, ovaca i pasa.

Sastav i djelatna tvar:
1 tableta sadrži:
800.0 mg Amoxicilina (jednako je 918.4 mg Amoxicilin trhidrata)

Indikacije za upotrebu:

Za liječenje sljedećih bolesti izazvanih gram-pozitivnim i/ili gram-negativnim uzročnicima osjetljivima na amoksisicilin.

Psi:

Primjena: p.o.

Indikacija: Infekcije pluća i dišnog sustava, probavnog sustava, urogenitalne infekcije, lokalizirane infekcije, sekundarne bakterijske infekcije nastale nakon virusnih infekcija.

Goveda, svinje, konji i ovce:

Primjena: i.u. (intrauterino)

Indikacija: Bakterijske infekcije endometrija, retencija placente

Prije početka terapije sa Veyxyl Tabs preporučljivo je odrediti osjetljivost uzročnika na amoksisicilin, posebno u slučaju infekcija probavnog sustava, budući da E.coli i Salmonellae vrlo brzo razvijaju otpornost na amoksisicilin.

Kontraindikacije:

Amoksisicilin se ne primjenjuje:

- Kod životinja preosjetljivih na peniciline i cefalosporine
- Kod teškog oštećenja bubrega koje prati anurija i oligurija

- Kod prisutnosti patogena koji tvore beta-laktamaze
- Oralnim putem za preživače, konje, kuniće, zamorce, hrčke i druge male glodavce
- Kod životinja koje teže manje od 40 kg

Nuspojave:

-alergijske reakcije (kožne reakcije, anafilaksa)

Ukoliko se pojavi alergijska reakcija na Veyxyl Tabs terapiju treba odmah prekinuti.

U slučaju anafilakse: Adrenalin (epinefrin) i glukokortikoidi, i.v.

Kod kožnih alergijskih reakcija: Antihistaminici i/ili glukokortikoidi.

Kod peroralne primjene mogu se povremeno javiti poremećaji probavnog sustava (povraćanje, proljev, anoreksija).

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o veterinarsko-medicinskom proizvodu, molimo obavijestite svog veterinara.

Ciljne vrste:

Goveda, svinje, konji, ovca, pas.

Način primjene i doze:

Kod peroralne primjene:

Psi iznad 40 kilograma tjelesne težine:

10 mg/kg, p.o., 2 puta dnevno tijekom 3-5 dana.

(10 mg amoksisilina po kilogramu tjelesne mase jednako je ½ tablete Veyxyl Tabs na 40 kg t.m.).

Tableta se može dati i u hrani.

Ukoliko nakon 3 dana provođenja terapije nema vidnog poboljšanja tada je potrebno preispitati dijagnozu i promijeniti terapiju. Preporučljivo je napraviti antibiogram.

S terapijom treba nastaviti 2 dana nakon nestanka kliničkih simptoma.

Kod intrauterine primjene:

Konji:

800 mg amoksisilina, jednako je 1 tableti Veyxyl® Tabs

Goveda:

400-800 mg amoksisilina, jednako je ½ -1 tablete Veyxyl® Tabs

Svinje, ovce:

400 mg amoksisilina, jednako je ½ tablete Veyxyl® Tabs

Provode se 2 tretmana u intervalu od 2 dana. Preporučljivo je napraviti antibiogram prije početka terapije.

Karenca:

Goveda, ovce, konji:
Meso i jestive iznutrice: 4 dana
Mlijeko: 2 dana
Svinje:
Meso i jestive iznutrice: 4 dana

Način čuvanja:

Držati izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na suhom mjestu na temperaturi do +25°C.
Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti naznačenog na pakiranju.

Sigurnost za osobe koje primjenjuju pripravak:

Osobe preosjetljive na peniciline trebaju izbjegavati direktni kontakt pripravka sa kožom ili sluznicama.

Interakcije s drugim farmakološkim pripravcima:

Postoji potencijalni antagonizam sa penicilinima i kemoterapeuticima.

U slučaju predoziranja javljaju se simptomi ekscitacije CNS-a, a mogu se pojaviti spazmi/konvulzije. Terapiju Veyxyl® Tabs tabletama treba prekinuti i odmah poduzeti simptomatsko liječenje administracijom benzodiazepina ili barbiturata.

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrebljenog proizvoda ili otpadnih materijala:

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.

Pakiranje:

Kutija sa 10 tableta.

Molimo pročitati uputu o lijeku prije korištenja veterinarsko-medicinskog proizvoda.